



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

## MÉDICO PEDIATRA

---

### INSTRUÇÕES:

Você receberá do fiscal: um **caderno de questões** e um **cartão de respostas** personalizado.  
As páginas do **caderno de questões** estão numeradas sequencialmente e contêm 50 questões.

#### ATENÇÃO !

- 1 - Verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- 2 - Verifique no verso do **cartão de respostas**, se seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo para o qual concorre estão corretos.
- 3 - Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que a responde corretamente.
- 4 - Observe as recomendações impressas no **cartão de respostas**.
- 5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **chefe de local**.
- 6 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, inclusive a marcação do **cartão de respostas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**.
- 7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** no verso.

---


### CALENDÁRIO PREVISTO

Divulgação do Gabarito - 04/06/2000

Prazo de Recurso - 05 e 06/06/2000

Dirigir o pedido de revisão ao Coordenador Geral do Concurso e entregá-lo no Protocolo da FMS, Av. Amaral Peixoto, 171, 4º andar - Centro - Niterói.

Obs.: Não serão recebidos recursos em local diverso do acima referido.



Realização

Núcleo de Computação Eletrônica  
Universidade Federal do Rio de Janeiro

---



## POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

**1 - À concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelo poder do Estado, corresponde:**

- a) uma noção autoritária de política social que bloqueia o direito à livre organização do trabalho em saúde em um contexto de cidadania restrito
- b) uma noção socialista de que a atenção à saúde deve ser estatal em um contexto de cidadania restrito
- c) uma noção centralizadora e vertical de Estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania regulada
- d) uma noção de Estado de bem-estar em que direitos sociais são elemento essencial em um contexto de cidadania plena

**2 - O modelo médico assistencial dominante nos anos 70 caracterizou-se, principalmente, pela oferta de serviços de saúde da seguinte forma:**

- a) universal à população brasileira, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional da Previdência Social
- b) prioritário às populações urbanas, através da compra de serviços privados por meio das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
- c) prioritário às populações inseridas no mercado de trabalho formal, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional de Previdência Social
- d) universal à população brasileira pelo Ministério da Saúde, complementado através da compra de serviços privados para os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal

**3 - A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, apresenta a saúde como:**

- a) resultado do acesso do cidadão aos serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos
- b) resultado da organização social da produção, abrangendo diversos aspectos das condições de vida
- c) um completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não simplesmente a ausência de doença
- d) um estado ótimo de adaptação do indivíduo, entre seu meio ambiente físico e social e suas características psíquicas

**4 - A Lei 8.080, sobre o Sistema Único de Saúde, pode ser considerada insatisfatória no seguinte aspecto:**

- a) a população está excluída dos fóruns de discussão e decisão, mantidas as antigas estruturas decisórias nas mãos de grupos fechados nos gabinetes do Estado
- b) a estrutura proposta para o SUS termina por manter a antiga dicotomia ações preventivas x ações curativas
- c) a proposta de descentralização é frágil e não permite a quebra da tradição brasileira de centralização de decisões em nível federal
- d) as relações políticas e financeiras do SUS com o chamado sistema de atenção médica supletiva não foram regulamentadas

**5 - Segundo a Norma Operacional Básica 96 (NOB) do Ministério da Saúde, gerência é definida como:**

- a) a direção de um sistema de saúde municipal, estadual ou nacional
- b) a administração de uma unidade ou órgão de saúde prestador de serviços ao SUS
- c) a administração de uma unidade ou órgão de saúde ou a direção de um sistema de saúde municipalizado
- d) a direção de órgãos coordenadores de atividades de saúde no nível municipal, como a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária

**6 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, o Piso de Atenção Básica (PAB) é:**

- a) um conjunto de ações de saúde consideradas básicas no nível de atenção primária
- b) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada município
- c) um conjunto de ações de saúde considerado suficiente para ser oferecido gratuitamente à população
- d) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada estado e por este redistribuído aos municípios

**7 - A condição essencial para um município obter gestão plena do sistema de saúde municipal é apresentar:**

- a) um Conselho Municipal de Saúde organizado
- b) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos nos níveis primário e secundário
- c) um plano de consórcio com municípios vizinhos, para oferecer uma rede de serviços completa à população
- d) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos em no nível primário, podendo conveniar e credenciar os níveis mais complexos

**8** - A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos serviços de saúde na condução do SUS tem como objetivo explícito:

- a) incrementar a participação e controle social
- b) economizar gastos com recursos humanos
- c) disciplinar, controlar e reprimir a população
- d) economizar gastos com infra-estrutura de saneamento

**9** - O enfoque epidemiológico no modelo de atenção à saúde proposto pela Norma Operacional Básica 96 recomenda aos municípios que:

- a) restrinjam as ações de saúde àquelas de cunho estritamente preventivo, pois são muito mais eficazes
- b) identifiquem grupos de risco em cada município, para a eventualidade de ser necessário isolá-los em quarentena
- c) privilegiem as ações de saúde centradas no meio ambiente, na qualidade de vida e na noção de atenção integral à saúde
- d) notifiquem a emergência de epidemias em seu território à Fundação Nacional de Saúde, para que esta proceda a campanhas de imunização

**10** - Segundo a Norma Operacional Básica 96, a relação entre os serviços de saúde e a população deve ter, como foco principal, uma ética pautada por:

- a) lógica política vigente em cada município
- b) princípios básicos do código de ética médica
- c) proposta coletiva que transcende o individual
- d) padrões regionais definidos nas constituições estaduais

## MÉDICO PEDIATRA

**11** - Menina de onze anos, apresentando asma brônquica grave e uso continuado de corticóide em altas doses, suspende bruscamente a medicação, por conta própria. Quatorze dias depois, apresenta cefaléia intensa e vômitos matutinos. Tais evidências sugerem:

- a) hidrocefalia aguda
- b) cisticercose latente
- c) abscesso amebiano
- d) pseudotumor cerebral

**12** - O agente causal de osteomielite mais comumente encontrado no portador de anemia falciforme é:

- a) estafilococo
- b) salmonela
- c) klebsiela
- d) proteus

**13** - A presença em crianças de uma combinação de crises miotônicas e clônicas frequentes, com EEG mostrando características definidas, sugere quadro de síndrome de:

- a) Bell
- b) West
- c) Alport
- d) Lennox-Gastaut

**14** - Recém-nascido a termo, de um dia, é levado ao pronto-socorro, devido ao surgimento de icterícia. A icterícia é considerada patológica quando:

- a) durar mais de 5 dias
- b) tiver início antes de 24 horas de vida
- c) a bilirrubina indireta alcançar 8mg/dL
- d) a bilirrubina alcançar concentração máxima no 3º dia

**15** - Em crianças com alergia a ovo de galinha deve ser evitada a administração da seguinte vacina:

- a) antitetânica
- b) antidiftérica
- c) MMR
- d) OPV

**16** - Um lactente comparece à emergência com quadro clínico e história sugestivos de meningite tuberculosa não tratada. Um dado do líquido que pode conduzir ainda mais essa suspeita é se as proteínas estiverem:

- a) aumentadas
- b) diminuídas
- c) ausentes
- d) normais

**17** - Uma das características da crise convulsiva febril benigna da infância é:

- a) ocorrer acima de 5 anos
- b) durar mais de 15 minutos
- c) ser tônico-clônica generalizada
- d) deixar sequelas motoras transitórias

**18** - A síndrome de Guillain-Barré faz diagnóstico diferencial com a poliomielite. A principal diferença, ao exame clínico, é que, nos pacientes com a síndrome, a paralisia é:

- a) descendente
- b) irreversível
- c) recorrente
- d) simétrica

**19** - Menino em idade pré-escolar é levado à emergência com quadro de instalação súbita, rouquidão, dispnéia inspiratória e febre alta. O exame clínico revela epiglote edemaciada, de cor vermelho rubro. O agente causal envolvido é o:

- a) adenovírus
- b) echovírus
- c) hemófilo
- d) proteus

**20** - Em relação à intoxicação por salicilatos, o distúrbio geralmente encontrado é:

- a) alcalose respiratória
- b) alcalose metabólica
- c) acidose respiratória
- d) acidose metabólica

**21** - O agente etiológico da "síndrome da pele escaldada" é o:

- a) proteus
- b) estafilococo
- c) estreptococo
- d) meningococo

**22** - Menina de dois anos é levada à emergência, com relato de ter sido mordida minutos antes por cão suspeito de ser portador de raiva. Após lavagem copiosa com água e sabão, deve-se empregar na lesão:

- a) éter
- b) álcool
- c) mercurocromo
- d) água oxigenada

**23** - O agente etiológico mais frequentemente envolvido como causa de bronquiolite é o:

- a) vírus sincicial respiratório
- b) "*haemophilus influenzae*"
- c) "*staphylococcus aureus*"
- d) coxsackievírus

**24** - A tríade característica em caso de intoxicação grave por opiáceo é:

- a) hipotensão, poliúria, hiperpnéia
- b) convulsões, broncoespasmo, diarreia
- c) broncoespasmo, diarreia, hiporreflexia
- d) coma, depressão respiratória, miose puntiforme

**25** - Criança de 2 anos chega ao pronto-socorro com quadro de tosse espasmódica intensa, sem febre ou dispnéia. Hemograma realizado revela leucometria total de 56.000, com 70% de linfócitos. O quadro sugere diagnóstico de:

- a) asma brônquica
- b) mononucleose
- c) coqueluche
- d) sarampo

**26** - Das formas abaixo relacionadas de infecção por "*Haemophilus influenzae*" (grupo B), aquela que é considerada invasiva e deve ser tratada de forma agressiva é:

- a) celulite
- b) sinusite
- c) otite média
- d) infecção urinária

**27** - A causa mais comum de estridor laríngeo em neonatos é a:

- a) laringomalácia
- b) atresia de laringe
- c) estenose de laringe
- d) paralisia de cordas vocais

**28** - Numa criança em coma por ingestão de barbitúricos, pela escala de Glasgow, a abertura espontânea dos olhos equivale, em ponto, a:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

**29** - Uma criança nasce na sala de emergência. Atribui-se um ponto na escala de Apgar e deve-se estar atento à possibilidade de asfixia quando os batimentos cardíacos estão presentes, porém inferiores a:

- a) 100
- b) 110
- c) 120
- d) 140

**30** - Um lactente de seis meses comparece à sala de emergência com quadro de desidratação aguda e uma perda de peso de 11%, em relação ao dia anterior. O sódio sérico é de 158 mEq/l. O quadro sugere uma desidratação do seguinte tipo:

- a) hipertônica do 2º grau
- b) hipertônica do 3º grau
- c) isotônica do 2º grau
- d) isotônica do 3º grau

**31** - Um neonato é levado ao pronto-socorro com queixa de choro intermitente. Durante o exame, realiza-se uma manobra que pode sugerir a presença de subluxação do quadril. Trata-se da manobra de:

- a) Salter
- b) Harris
- c) Silver
- d) Ortolani

**32** - Uma criança comparece à emergência com história de ingestão accidental de benzodiazepínico em grande quantidade. A droga antagonista que deve ser utilizada nesse caso é:

- a) isolarina
- b) naloxona
- c) metadona
- d) flumazenil

**33** - A insuficiência cardíaca é uma complicação relativamente comum em crianças portadoras de glomerulonefrite aguda. É conseqüente a fatores:

- a) hemodinâmicos
- b) imunológicos
- c) hereditários
- d) infecciosos

**34** - A ação antibacteriana do metronidazol é importante no seguinte grupo de bactérias:

- a) anaeróbicas
- b) encapsuladas
- c) aeróbicas gram-positivas
- d) aeróbicas gram-negativas

**35** - O uso de salicilatos deve ser evitado, pela associação com a síndrome de Reye, na seguinte patologia:

- a) tuberculose
- b) epiglote
- c) varicela
- d) anemia

**36** - Criança comparece à emergência com quadro de doença meningocócica de rápida evolução. O dado que sugere forma fulminante é:

- a) aumento dos níveis tensionais
- b) leucocitose maior que 20.000
- c) ausência de meningite
- d) febre alta

**37** - Lactente é levado ao pronto-socorro com quadro de irritabilidade e história de crise convulsiva recente. A mãe relata que a criança está fazendo uso de drogas no tratamento de tuberculose. O quadro pode sugerir deficiência da seguinte vitamina:

- a) A
- b) B6
- c) B12
- d) D

**38** - Pré-escolar comparece à emergência com quadro de suboclusão intestinal por ascaris. O anti-helmíntico preconizado como coadjuvante no tratamento clínico é:

- a) piperazina
- b) niclosamida
- c) mebendazol
- d) metronidazol

**39** - É necessário muito cuidado no exame clínico de crianças, principalmente dos orifícios da face, em casos de infecções altas, para excluir a possibilidade de difteria. As lesões pseudomembranas típicas são encontradas mais comumente na seguinte região:

- a) nariz
- b) língua
- c) ouvido médio
- d) amígdala palatina

**40** - No paciente portador de síndrome nefrótica idiopática, o mecanismo do edema se dá basicamente por:

- a) insuficiência renal aguda
- b) hiperlipidemia refratária ao tratamento
- c) diminuição da pressão oncótica do plasma
- d) desnutrição severa devido à perda protéica

**41** - Escolar de dez anos é internado na emergência com quadro de tosse e dispnéia leve. O raio X do torax mostra infiltrados difusos e o exame de escarro, larvas de áscaris lumbricóides.

Trata-se da síndrome de:

- a) West
- b) Alport
- c) Lyme
- d) Loeffler

**42** - Lactente é levado ao pronto-socorro com quadro de exantema. Seus pais informam quadro de febre alta, de início dois dias antes, e um episódio de crise convulsiva. O exantema surgiu no dia do atendimento com o desaparecimento da febre.

Tal quadro sugere fortemente o diagnóstico de:

- a) rubéola
- b) varicela
- c) coxsackiose
- d) roséola infantil

**43** - Recém-nascido em casa é levado ao pronto-socorro, pois a mãe notou a presença de pequenas pápulas brancas na região malar e nariz. Após exame cuidadoso, o plantonista libera a criança sem prescrição. Trata-se provavelmente de:

- a) sífilis secundária
- b) milium sebáceo
- c) impetigo bolhoso
- d) melanose neonatal

**44** - Um menino de doze anos dá entrada no pronto-socorro após uso de grande quantidade de cocaína via endovenosa, tendo parada cardíaca respiratória irreversível no momento da entrada. O acompanhante afirma que a última dose havia sido injetada momentos antes. O mecanismo que provavelmente desencadeou a morte foi:

- a) ação tóxica direta no miocárdio
- b) inibição do centro respiratório
- c) isquemia cerebral fulminante
- d) embolia gasosa

**45** - Criança hipertensa, em uso de hipotensor, apresenta crises de broncoespasmo. O medicamento que pode desencadear esse quadro pulmonar é:

- a) hidralazina
- b) propranolol
- c) nifedidina
- d) enalapril

**46** - A pseudoparalisia de Parrot é encontrada com relativa frequência na seguinte patologia:

- a) desnutrição
- b) toxoplasmose
- c) sífilis congênita
- d) osteogênese imperfeita

**47** - Neonato comparece à emergência com quadro de catarata, microftalmia e suspeita de estenose da artéria pulmonar. Tais achados são mais sugestivos da seguinte doença congênita:

- a) SIDA
- b) difteria
- c) rubéola
- d) toxoplasmose

**48** - A síndrome mão, pé, boca é causada pelo seguinte vírus:

- a) echo
- b) polio
- c) herpes
- d) coxsackie

**49** - A hemólise em prematuros extremos pode ser devida, entre outros fatores, à deficiência da seguinte vitamina:

- a) A
- b) C
- c) D
- d) E

**50** - Menina de 11 anos chega à emergência com história de emagrecimento e enurese noturna há um mês. A família refere-se a episódios de vômitos intensos e dor abdominal, de início 24 horas antes. Ao exame, entre outros achados, o plantonista constata a presença de desidratação severa. Tal quadro é sugestivo de:

- a) leucemia linfócita aguda
- b) cetoacidose diabética
- c) intoxicação exógena
- d) gravidez ectópica