

CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **11**.

Até o mais camicase dos acadêmicos concorda que, no eterno debate sobre qualidade na televisão, o que está em pauta é um veículo de mercado, que como tal depende umbilicalmente da audiência. Se tolerar o Ratinho pode parecer um excesso de democracia, ninguém está propondo para o horário nobre *Telecurso Segundo Grau* ou palestra de Umberto Eco: é entre o que a audiência deseja ver que se deve achar um circo possível, **cujo** pão não esteja irremediavelmente envenenado.

No momento, o circo se chama *Show do Milhão*. (...)Nele, o que se quer ver é o sonho da casa própria ou da vida sem trabalho duro, a ascensão do guarda-noturno ou a humilhação do marceneiro, assim como na novela das oito, na qual se torce para que os personagens se superem ou se afundem em suas encruzilhadas existenciais.

Mas as peripécias pouco significariam sem uma condução adequada, capaz de potencializá-las. É aí que entra Sílvio Santos. Com uma breve conversa introdutória, em que o candidato revela o seu local de nascimento, o seu estado civil e a sua maior ambição, o apresentador é capaz de dar grandeza imediata a trajetórias que quase nada têm de interessante. A psicologia dos concorrentes é extraída desses diálogos intercalados com as perguntas do jogo, mesmo que sejam diálogos mínimos, do tipo "tem certeza de que a resposta é essa?"

Na forma como eles são levados adiante está a natureza da empatia: dependendo de como o participante reage, terá torcida ou não, será mais interessante ou não, dará mais ibope ou não. Manipular essas possibilidades é a habilidade primeira de um dos grandes comunicadores brasileiros. Ninguém duvida disso. Sem ela, o *Show do Milhão* não seria o palco televisivo onde se encontra hoje a maior intensidade de drama, de comédia e de tragédia num formato essencialmente popular.

(Revista Bravo, novembro de 2001, p.143)

01. Segundo o texto,

- (A) o programa do Ratinho é essencialmente democrático.
- (B) no horário nobre deveríamos ouvir palestra de Umberto Eco.
- (C) qualidade na televisão depende do mercado.
- (D) a programação televisiva lembra a apresentação circense.
- (E) alguma coisa pode ser salva no gosto da audiência.

02. Entre os acadêmicos é consenso

- (A) adotar uma política de pão e circo para a cultura.
- (B) reconhecer o direito de cada um realizar seu sonho.
- (C) aceitar programas populares como sinal de democracia.
- (D) estabelecer relação entre televisão e audiência.
- (E) propor programas de cultura para o horário nobre.

03. No *Show do Milhão*, assim como nas novelas,

- (A) assiste-se à realização do sonho dos apresentadores.
- (B) prestigiam-se o talento e a coragem dos participantes.
- (C) busca-se uma identificação com a trajetória das personagens.
- (D) procura-se uma fórmula para resolver problemas.
- (E) tenta-se amenizar o peso da realidade cotidiana.

04. Dizer que a televisão depende umbilicalmente da audiência significa afirmar que a relação entre elas é

- (A) superficial.
- (B) profunda.
- (C) aleatória.
- (D) epidérmica.
- (E) irrelevante.

05. Ao dialogar com os participantes, Sílvio Santos

- (A) redimensiona a simplicidade de suas vidas.
- (B) traz à tona aspectos da vida do apresentador.
- (C) torna público o que é essencialmente privado.
- (D) revela uma inclinação à sátira e ao deboche.
- (E) avalia o nível de cultura do brasileiro em geral.

06. Assinale a alternativa correta sobre o possível sucesso do participante.

- (A) Um diálogo ágil e contundente garante o ibope do participante.
- (B) O participante ganha audiência, manipulando o apresentador.
- (C) O apresentador dá ao participante todas as oportunidades para conquistar o público.
- (D) Sem a torcida, o participante não obteria nenhuma vitória.
- (E) A reação do participante está na relação direta de seu êxito.

07. A habilidade de Sílvio Santos consiste em

- (A) manter o telespectador sintonizado.
- (B) manipular os índices de audiência.
- (C) gerar uma expectativa na platéia.
- (D) explorar o potencial do participante.
- (E) levar o participante à exaustão.

08. Em síntese, o *Show do Milhão*

- (A) tem como objetivo a promoção da cultura.
- (B) enfatiza a personalidade de Sílvia Santos.
- (C) aciona os componentes humanos das pessoas.
- (D) eleva o nível de conhecimento do telespectador.
- (E) transforma a vida do telespectador numa comédia.

09. Os pronomes **cujo** e **las**, em negrito no texto, referem-se, respectivamente, a

- (A) pão e condução.
- (B) circo e peripécias.
- (C) envenenado e encruzilhadas.
- (D) audiência e personagens.
- (E) pão e existenciais.

10. Assinale a alternativa correta sobre o plural da frase: O apresentador é capaz de promover a ascensão do guarda-noturno ou o sonho da casa própria.

- (A) Os apresentadores são capazes de promover as ascensões dos guardas-noturnos ou os sonhos das casas próprias.
- (B) O apresentador são capaz de promoverem as ascensões dos guarda-noturnos ou os sonhos da casas própria.
- (C) Os apresentadores são capazes de promover as ascensões dos guardas-noturno ou os sonhos da casa própria.
- (D) Os apresentadores são capazes de promoverem a ascensão do guarda-noturnos ou os sonhos da casa próprias.
- (E) Os apresentadores são capazes de promover as ascensões dos guarda-noturnos ou os sonho da casa própria.

11. Na frase – assim como na novela das oito *na qual* se torce *para que* os personagens se superem ou se afundem em suas encruzilhadas existenciais. – as expressões em destaque podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido, por

- (A) qual e onde.
- (B) cuja, de modo que.
- (C) que, de forma que
- (D) em que, a tal ponto que.
- (E) em que, a fim de que.

12. Assinale a alternativa correta quanto à correlação dos tempos verbais, de acordo com a norma culta.

- (A) Se o velejador não tivesse reagido, não terá sido morto.
- (B) Nosso patrimônio cultural será dos mais bens aproveitados, se não fosse o analfabetismo no país.
- (C) Se as companhias aéreas não reformularem os preços das passagens, não teriam mais passageiros.
- (D) Por mais que o Banco Central vendesse moeda americana, parecia não haver limite para a alta.
- (E) É provável que a atriz volta a apresentar-se na televisão.

13. Assinale a alternativa correta quanto à concordância.

- (A) Artistas, escritores e desportistas, na Bahia, promove manifestação em favor do candidato.
- (B) *Dona flor e seus dois maridos*, sucesso de bilheteria, voltam à tela depois de vinte e cinco anos.
- (C) Companhias de cerveja deverão trocar amigos sertanejos e baixinhos por loiras e morenas, as chamadas musas etílicas.
- (D) Com a queda do regime, as mulheres ficaram meias perdidas com as novas regras.
- (E) O roqueiro e a artista conseguiu transformar o evento num grande espetáculo.

14. Assinale a alternativa correta quanto à ortografia e/ou acentuação.

- (A) O IBGE anuncia que a expectativa de vida do brasileiro cresceu 2,6 anos em relação à década passada.
- (B) O ato terrorista provocou um retrocesso nas liberdades civis e implantou o medo em escala planetária.
- (C) O atentado levou ao aciramento da convivência possível no Oriente Médio e fortaleceu a extrema direita belicista.
- (D) O naufragio foi resultado de uma sequência de três explosões numa das partes do navio.
- (E) Um consórcio internacional formado por tres médicos anunciou a intenção de produzir clones para casais sem filhos.

15. Na frase – O apresentador disse: tem certeza de que a resposta é essa? – os dois pontos foram usados para

- (A) introduzir a fala do interlocutor.
- (B) apresentar um ponto de vista.
- (C) expressar uma opinião.
- (D) suscitar uma afirmação.
- (E) provocar uma intimidação.

16. O processo administrativo disciplinar pode ser revisto perante fatos novos ou elementos não apreciados no processo, suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada,

- (A) a pedido, no prazo de 120 dias contados da publicação da decisão punitiva.
- (B) de ofício, antes da ocorrência da prescrição quinquenal.
- (C) a pedido, nos dois anos subseqüentes ao término do processo.
- (D) de ofício, no prazo de um ano, contado da aplicação da penalidade disciplinar.
- (E) de ofício ou a pedido, a qualquer tempo.

17. O provimento, quanto à sua durabilidade, pode ser classificado em

- (A) horizontal, vertical e originário.
- (B) efetivo, vitalício e em comissão.
- (C) derivado, vertical e vitalício.
- (D) horizontal, originário e efetivo.
- (E) vitalício, em comissão e derivado.

18. Leia com atenção.

- I. Exercer com zelo e presteza as atribuições do cargo.
- II. Retirar, sem prévia anuência de autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
- III. Ser assíduo e pontual ao serviço.
- IV. Proceder de forma desidiosa.
- V. Praticar usura sob qualquer de suas formas.

Assinale a alternativa correta.

- (A) I e II, são deveres.
- (B) III e IV, são proibições.
- (C) II e IV, são deveres.
- (D) I e V, são proibições.
- (E) I e III, são deveres.

19. O plenário do Tribunal Regional Federal da 3ª Região é constituído

- (A) pelos quinze Desembargadores Federais mais antigos do Tribunal.
- (B) por dezoito Desembargadores Federais.
- (C) pela totalidade dos Desembargadores Federais.
- (D) por quinze Desembargadores Federais mais o Vice-Presidente.
- (E) por Turmas Especializadas.

20. Se ocorrer vacância do cargo de Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, durante o primeiro semestre do mandato, assumirá o exercício do cargo, pelo tempo restante, o

- (A) Vice-Presidente, que se tornará inelegível para o período seguinte.
- (B) Desembargador Federal mais antigo, que poderá concorrer ao cargo de Presidente no período seguinte.
- (C) Corregedor-Geral, que se tornará inelegível para o período seguinte apenas no cargo de Presidente.
- (D) eleito na primeira sessão ordinária do Órgão Especial, que completará o período de ser antecessor.
- (E) Desembargador Federal mais antigo, que se tornará inelegível para o período seguinte.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Segundo a Lei nº 5.905 de 12/07/73, os Conselhos Regionais de Enfermagem - COREN devem ser constituídos por 5 (cinco) a 21 (vinte e um) membros e outros tantos suplentes, na proporção de

- (A) três quintos de enfermeiros e dois quintos de profissionais das demais categorias.
- (B) um terço de enfermeiros, um terço de técnicos de enfermagem e um terço de auxiliares de enfermagem.
- (C) metade de enfermeiros e metade composta por técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e atendentes.
- (D) dois quintos de enfermeiros e três quintos de profissionais das demais categorias.
- (E) um terço de enfermeiros e dois terços de técnicos e auxiliares de enfermagem e atendentes.

22. Em relação à Comissão de Ética de Enfermagem, é possível afirmar que

- (A) é obrigatória apenas em instituições de saúde onde são realizadas pesquisas em enfermagem.
- (B) é constituída por um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem que tenham vínculo empregatício com a instituição e um representante do COREN.
- (C) tem como uma de suas finalidades notificar ao COREN de sua jurisdição irregularidades, reivindicações, sugestões e infrações éticas.
- (D) deve ser constituída a critério da chefia de enfermagem que indicará, de acordo com o número de funcionários, quais profissionais deverão compô-la.
- (E) é obrigatória em qualquer instituição que admita profissionais de enfermagem, devendo ser constituída, exclusivamente, por enfermeiros.

Para responder a próxima questão, considere os itens a seguir:

- I. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência.
- II. Assegurar ao cliente assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- III. Promover a eutanásia ou cooperar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.

23. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, constitui-se em direito do profissional o(s) item(ns)

- (A) III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Leia atentamente o relato de caso a seguir.

O Sr. Antonio é técnico judiciário e compareceu ao ambulatório para realizar o exame periódico de saúde. Ao chegar, informou que havia subido cinco andares a pé pelas escadas, pois estava atrasado. Conforme os procedimentos de rotina, a auxiliar de enfermagem verificou os sinais vitais do Sr. Antonio, obtendo os seguintes resultados: temperatura axilar: 37,8 °C; pulso: 90 bat/min (batimentos por minuto); respiração: 22 resp/min (respirações por minuto) e PA: 138 x 90 mmHg.

24. Considerando-se os dados obtidos, a auxiliar de enfermagem deve

- (A) priorizar o atendimento do Sr. Antonio, uma vez que este apresenta hipertermia e hipertensão.
- (B) solicitar prescrição médica para administrar medicação antitérmica e hipotensora.
- (C) punccionar uma veia periférica e solicitar atendimento médico de urgência.
- (D) solicitar que o Sr. Antonio fique em repouso e, após 15 minutos, repetir a verificação dos sinais vitais.
- (E) administrar uma dose de medicação antitérmica, via oral, conforme rotina prevista.

25. Marcos é portador de insuficiência cardíaca congestiva. Para manter a doença sob controle faz uso, entre outras drogas, de um diurético à base de furosemda. Durante a pós consulta, o auxiliar de enfermagem deve orientar Marcos sobre os principais efeitos colaterais observados no uso deste medicamento, que incluem

- (A) erupções cutâneas e icterícia.
- (B) hiperpotassemia e hipotonia muscular.
- (C) icterícia e mialgia.
- (D) epigastralgia e mialgia.
- (E) câibras e hipotensão ortostática.

26. Pacientes diabéticos insulínodpendentes devem receber acompanhamento e orientação médica e de enfermagem contínuos, pois diversas condições podem determinar a necessidade de ajustes nas doses de insulina. Uma condição que, de modo geral, exige aumento na dose de insulina é

- (A) a intensificação da atividade física.
- (B) o aumento do peso corporal.
- (C) o uso de adoçantes artificiais.
- (D) a presença de lipodistrofias.
- (E) o processo de envelhecimento do indivíduo.

27. A prescrição médica é:

Decadron 4 mg EV, agora.

Para preparar esta medicação, a farmácia forneceu ampolas com 2 ml de Decadron a 0,4%. Para executar esta prescrição, a auxiliar de enfermagem deverá aplicar, no paciente,

- (A) 0,25 ml.
- (B) 0,5 ml.
- (C) 1,0 ml.
- (D) 1,5 ml.
- (E) 2,0 ml.

28. Assinale a alternativa correta.

- (A) Ao se administrar uma medicação por via intradérmica, a droga deve ser injetada no tecido adiposo do paciente.
- (B) A embolia é a complicação mais freqüente devido ao uso de má técnica na aplicação de medicamentos por via intramuscular.
- (C) Em aplicações por via intradérmica, uma agulha hipodérmica, com calibre 30 x 7, deve ser introduzida com ângulo de 90° em relação à pele.
- (D) A aplicação freqüente de soluções hipertônicas num mesmo local provoca o aparecimento de petéquias.
- (E) Para ser aplicada por via endovenosa, a solução deve ser cristalina, não oleosa e não conter flocos em suspensão.

29. O Sr. Carlos precisou ser internado na unidade de cardiologia por apresentar um quadro de cardiopatia descompensada. A prescrição médica para o horário das 8:00 horas determina administração de 1 comprimido de Digtoxina, por via oral. Este medicamento só deverá ser administrado caso o paciente apresente

- (A) pressão arterial abaixo de 120 x 80 mmHg.
- (B) pulso arritmico, inferior a 60 batimentos por minuto.
- (C) diurese inferior a 400 ml em 24 horas.
- (D) pulso igual ou superior a 60 batimentos por minuto.
- (E) pressão arterial acima de 150 x 100 mmHg.

Para responder a questão, leia atentamente o caso a seguir.

O Sr. Sérgio é gerente administrativo. Durante o exame periódico informou que tem se sentido muito ansioso e estressado, o que faz com que fume mais de 20 cigarros por dia. Sua longa jornada de trabalho o impede de se alimentar adequadamente e fazer exercícios físicos regulares. Na pré consulta, a auxiliar de enfermagem verificou que o Sr. Sérgio apresentava excesso de peso e sua pressão arterial estava elevada (150 x 100 mmHg).

30. Neste caso, o Sr. Sérgio apresenta diversos fatores de risco para a ocorrência de

- (A) infarto do miocárdio.
- (B) câncer de fígado.
- (C) edema agudo de pulmão.
- (D) insuficiência cardíaca congestiva.
- (E) varizes de membros inferiores.

31. Indivíduos diabéticos, entre outras recomendações, devem ser orientados quanto à necessidade de

- (A) inspecionar diariamente os pés, verificando a existência de áreas com diminuição da sensibilidade ou formação de calosidades.
- (B) usar calçados firmes para trabalhar e, quando necessário, aplicar agentes cáusticos em calos para eliminá-los.
- (C) evitar o uso de meias com os sapatos e andar descalço em casa para o descanso dos pés e ventilação da pele.
- (D) usar os calçados um número acima do habitual, preenchendo os espaços vazios com algodão ou material similar.
- (E) retirar os calos dos pés com o auxílio de gilete ou lâminas e, a seguir, desinfetar a área com álcool.

32. A tuberculose é uma doença infecciosa e de evolução lenta. São considerados suspeitos os indivíduos que apresentam

- (A) ganho ponderal, febre intermitente com sudorese profusa e dor abdominal.
- (B) ganho ponderal, mal estar geral, dificuldade para deambular.
- (C) placas eritematosas nas mãos e planta dos pés, sensação de anestesia e inapetência.
- (D) tosse há mais de três semanas, inapetência, febre baixa vespertina com sudorese.
- (E) dificuldade em deambular, sensação de anestesia na palma das mãos e planta dos pés, febre matinal.

33. A vacinação é considerada como uma prática eficaz na prevenção de determinadas doenças infecciosas. Para indivíduos com mais de 7 anos de idade, a proteção contra o tétano e a difteria pode ser obtida aplicando-se a vacina

- (A) BCG.
- (B) MMR.
- (C) tríplice viral.
- (D) Sabin.
- (E) dupla adulto.

“GOIÁS – Arrasado pelas chuvas, o centro histórico de Goiás começa a dar sinais de recuperação com a ajuda dos moradores. Várias pessoas, junto com os bombeiros e policiais, limpam ontem os casarios e retiraram objetos que não se perderam no Rio Vermelho”.
(O Estado de S. Paulo, 04.01.2002)

34. Indivíduos que entraram em contato com águas de enchentes, potencialmente contaminadas por urina de ratos, estão sob risco de desenvolver

- (A) meningite meningocócica.
- (B) malária.
- (C) leptospirose.
- (D) febre amarela.
- (E) botulismo.

35. Regina procurou o ambulatório da empresa em que trabalha apresentando-se icterica e queixando-se de mal estar geral, vômitos e fezes esbranquiçadas. Os resultados dos exames colhidos confirmaram a suspeita de hepatite A. Frente ao diagnóstico, as orientações de enfermagem deverão incluir a necessidade de isolamento

- (A) total, devendo ser usada uma solução de formol a 50% no tratamento de objetos contaminados com sangue da doente.
- (B) entérico, exigindo o tratamento dos dejetos (fezes e urina) da paciente com solução de hipoclorito de sódio a 0,5% ou 1%.
- (C) reverso, devendo ser usada uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5% ou 1% dos dejetos (fezes e urina) e objetos contaminados com sangue da doente.
- (D) total, devendo ser usada uma solução de formol a 50% no tratamento dos dejetos (fezes e urina) da paciente.
- (E) rigoroso, devendo ser usada uma solução de formol a 0,5% ou 1% no tratamento dos dejetos (fezes e urina) e objetos contaminados com sangue da doente.

Considere os itens abaixo:

- I. Educação sanitária e sexual;
- II. Recomendação do uso de preservativos em contatos sexuais;
- III. Orientação da população sobre os principais sinais e sintomas das doenças sexualmente transmissíveis – DST.

36. O auxiliar de enfermagem deve atuar na profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis – DST, desenvolvendo ações relacionadas ao(s) item(ns)

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

37. Na fase aguda, casos de sarampo, meningite meningocócica e AIDS exigem, respectivamente, a adoção de isolamento do tipo

- (A) total, entérico, respiratório.
- (B) respiratório, respiratório, reverso.
- (C) parcial, reverso, entérico.
- (D) respiratório, total, reverso.
- (E) total, reverso, total.

38. Para sobreviver a condições ambientais adversas tais como: calor, radiação, congelamento ou ação de substâncias químicas, alguns tipos de bactérias defendem-se formando em seu interior uma célula desidratada única, denominada

- (A) bacilo.
- (B) mitocôndria.
- (C) esporo.
- (D) estreptococo.
- (E) vírus.

39. Desinfecção é o processo pelo qual

- (A) se obtém a remoção da flora microbiana transitória da pele.
- (B) são destruídas as formas vegetativas de microrganismos em materiais, equipamentos e superfícies.
- (C) são removidas as sujidades de equipamentos, instrumentais e superfícies, mecanicamente.
- (D) são destruídas todas as formas de vida microbiana de materiais, equipamentos e superfícies.
- (E) se obtém a remoção da flora microbiana permanente da pele.

40. De acordo com o risco de contaminação, os artigos hospitalares de saúde são classificados em:

- (A) não críticos, semicríticos, críticos e contaminados.
- (B) invasivos, semicríticos, críticos e perfurocortantes.
- (C) não críticos, críticos, contaminados e perfurocortantes.
- (D) perfurantes, cortantes, contaminados e críticos.
- (E) contaminados, perfurantes, invasivos e críticos.

41. O prazo de validade de artigos submetidos à esterilização está relacionado com o modo de estocagem, as condições de armazenamento, o manuseio do material e

- (A) a capacidade da autoclave.
- (B) o tipo de invólucro usado.
- (C) o tempo dispendido no processo de esterilização.
- (D) o fluxo de distribuição para as unidades.
- (E) o tipo de usuário.

42. Os materiais a serem esterilizados pelo método de vapor saturado classificam-se em material de superfície e de densidade. São exemplos de materiais de densidade:

- (A) instrumental cirúrgico, cubas e bacias.
- (B) campos cirúrgicos, gases e aventais.
- (C) cubas, óleos e gases.
- (D) vidraria, bacias e luvas.
- (E) instrumental cirúrgico, campos operatórios e gases.

43. A imersão de inaladores por 30 minutos em solução de hipoclorito de sódio a 1% promove a sua

- (A) esterilização.
- (B) desencrostação.
- (C) degermação.
- (D) desinfecção.
- (E) sanitização.

44. Mariana é auxiliar de enfermagem do trabalho. Quando algum funcionário vai se submeter a uma cirurgia eletiva sob anestesia geral, costuma ensiná-lo como realizar exercícios respiratórios com auxílio de frascos, balão ou luvas de borracha. Este cuidado de enfermagem tem como objetivo

- (A) entreter o indivíduo durante o período de internação.
- (B) prevenir alterações do equilíbrio hidroeletrolítico no período trans-operatório.
- (C) prevenir complicações metabólicas no período pós-operatório.
- (D) diminuir a sensação de medo da anestesia.
- (E) prevenir complicações respiratórias no período pós-operatório.

45. D. Heloísa submeteu-se a uma nefrectomia. Já na Unidade de Recuperação Anestésica, ao recobrar a consciência, começou a apresentar náuseas. Para evitar a aspiração do vômito, caso ocorra, o auxiliar de enfermagem deve

- (A) voltar lateralmente a cabeça da paciente.
- (B) afrouxar o curativo compressivo.
- (C) realizar sondagem nasogástrica, imediatamente.
- (D) administrar medicação sedativa, se prescrita.
- (E) observar por 30 minutos e, se não ocorrer melhora, solicitar prescrição de antieméticos.

Entre os itens relacionados abaixo, selecione aqueles que completam, de forma correta, a afirmação apresentada na questão 46.

- | | |
|------------------------|--|
| α) infecção | δ) alta |
| β) infestação | Ω) administração de antibióticos |
| γ) mortalidade | θ) lavagem das mãos |

46. Nos pacientes cirúrgicos, a __ (1) __ é uma das causas mais frequentes de __ (2) __. Em relação à ferida cirúrgica, a __ (3) __ é uma medida preventiva eficaz.

- (A) 1 – β , 2 – δ , 3 – Ω .
- (B) 1 – α , 2 – δ , 3 – Ω .
- (C) 1 – Ω , 2 – γ , 3 – θ .
- (D) 1 – α , 2 – γ , 3 – θ .
- (E) 1 – β , 2 – γ , 3 – Ω .

47. A importância de uma dieta rica em fibras e a necessidade de se suprimirem alimentos condimentados são orientações de enfermagem dirigidas a indivíduos portadores de

- (A) hipertensão arterial.
- (B) nefrolitíase.
- (C) trombose venosa profunda.
- (D) hemorróidas.
- (E) empiema.

48. No pós-operatório imediato, salvo contra-indicações, pacientes submetidos a safenectomia devem ser mantidos em

- (A) decúbito ventral.
- (B) posição de Sims.
- (C) Trendelenburg.
- (D) posição de Fowler.
- (E) decúbito lateral direito.

49. O controle frequente dos sinais vitais no período pós-operatório imediato tem por finalidade

- (A) detectar precocemente sinais de hemorragia interna.
- (B) promover conforto e segurança do paciente.
- (C) estimular a movimentação e deambulação precoce.
- (D) prevenir a ocorrência de dispepsia.
- (E) detectar sinais de infecção na ferida operatória

Leia atentamente o relato de caso a seguir:

Andréa é diabética e faz uso de 40 UI de insulina NPH pela manhã. Ontem, por volta das 9:30 horas, chegou ao ambulatório, amparada por colegas de trabalho, referindo tonturas e sensação de desmaio. Apresentava-se hipotensa, pálida, com sudorese profusa e pegajosa. Informou à auxiliar de enfermagem que havia saído de casa sem tomar o desjejum, pois estava atrasada e, até aquele momento, ainda não havia se alimentado.

50. Considerando-se as informações obtidas, é possível que Andréa estivesse apresentando um quadro de

- (A) dislipidemia.
- (B) hiperglicemia.
- (C) hipoglicemia.
- (D) intoxicação exógena.
- (E) hipercolesterolemia.

51. A indução do vômito ou a lavagem gástrica são ações contra-indicadas quando a vítima intoxicada ingeriu

- (A) barbitúricos.
- (B) anfetaminas.
- (C) opiáceos.
- (D) substâncias cáusticas.
- (E) beladonados.

52. Os primeiros cuidados a serem prestados a uma vítima que apresenta entorse de tornozelo compreendem

- (A) repouso do membro afetado e aplicação de bolsa de gelo no local.
- (B) jejum e instalação de tração local.
- (C) aplicação de compressas quentes e remoção para o hospital.
- (D) imobilização do quadril, perna e pé e aplicação de compressas quentes no tornozelo.
- (E) manutenção do membro afetado em nível inferior ao corpo e aplicação de compressa quente no local.

53. Nos procedimentos de desfibrilação, a aplicação de pasta condutora nas pás (eletrodos) do desfibrilador é um cuidado que tem por objetivo evitar

- (A) a propagação da corrente para a maca ou cama.
- (B) queimaduras na pele do paciente.
- (C) a concentração da corrente elétrica em um só ponto.
- (D) queimaduras nas mãos daquele que realiza o procedimento.
- (E) a propagação da corrente para as pessoas que estão atendendo o paciente.

Considere os itens abaixo:

- I. hemorragia abdominal;
- II. amputação traumática de membros;
- III. fratura exposta com hemorragia maciça.

54. A aplicação de torniquete está indicada nas situações descritas nos itens

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas
- (D) II, apenas.
- (E) III, apenas

55. Segundo a abordagem psicológica, distúrbios de aspectos da personalidade nos quais se altera a relação com o mundo, mas permanece íntegra a capacidade de pensamento e de manter relações afetivas, define

- (A) psicose.
- (B) esquizofrenia.
- (C) neurose.
- (D) paranóia.
- (E) catatonia.

56. Durante a assistência pré-natal, as gestantes devem ser aconselhadas a não fumar, pois este hábito está associado à ocorrência de

- (A) diabetes gestacional.
- (B) isoimunização fetal.
- (C) placenta prévia.
- (D) gravidez ectópica.
- (E) recém nascidos de baixo peso.

57. Mariana está no 7º mês de gestação de seu primeiro filho. Procurou o ambulatório de saúde ocupacional da empresa onde trabalha porque deverá entrar de licença por apresentar um quadro de pré-eclâmpsia leve. A auxiliar de enfermagem aproveitou a oportunidade para orientá-la sobre a importância de controlar regularmente sua pressão arterial, repousar em decúbito lateral esquerdo e

- (A) evitar expor-se a luzes fortes e brilhantes.
- (B) ingerir dieta hipercalórica.
- (C) utilizar cama com grades laterais.
- (D) restringir a ingestão de líquidos.
- (E) ingerir dieta hipossódica.

58. Durante o trabalho de parto, a intensificação das contrações uterinas acompanhadas de “desejo de fazer força” e abaulamento do períneo caracterizam o início do período denominado como

- (A) gestacional.
- (B) de dilatação.
- (C) expulsivo.
- (D) de dequitação.
- (E) puerperal.

59. Temperatura axilar acima de 38 °C; útero amolecido e sub-involuído; mal estar geral e lóquios fétidos são sinais e sintomas de

- (A) mastite.
- (B) infecção puerperal.
- (C) rotura uterina.
- (D) trombose venosa profunda.
- (E) prolapso uterino.

60. Entre as infecções que podem acometer a gestante, a do trato urinário é uma das mais comuns. Torna-se importante seu diagnóstico e tratamento precoces, pois esta infecção pode desencadear

- (A) o trabalho de parto prematuro.
- (B) o prolongamento da gestação.
- (C) o prolapso do cordão umbelical.
- (D) a hiperemese gravídica.
- (E) a depressão pós parto.

